

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管して下さい。

猪 苓 湯

(ちよれいとう)

第2類医薬品

本剤は、漢方の古典「傷寒論」に記載されている猪苓湯に準拠して製造された煎薬用の紙パック剤です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の方は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

尿量が減少し、尿が出にくく、排尿痛、あるいは残尿感のあるもの。

【用法・用量】

大人（15才以上）は1包（1日量）につき水400mLを加えあまり強くない火にかけ200mLに煮つめ、紙袋とともに煎じかすを取り去り、食前1時間前又は食間空腹時に温服して下さい。小人（15才未満4才以上）は同様に煎じ、下記の量を食間空腹時に温服して下さい。

年 齢	1包(1日量) 煎じ液	1日服用回数	年 齢	1包(1日量) 煎じ液	1日服用回数
大人(15才以上)	全 量	3～2回 に分けて	15才未満7才以上	2/3量	3回に分けて
			7才未満4才以上	1/2量	
			4才未満	服用しないこと	

【用法・用量に関連する注意】


- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- 用法・用量を厳守すること。

【成分・分量】 [本品1包（1日量）15.0g中]

日本薬局方 チョレイ…………… 3.0g	日本薬局方 ゼラチン…………… 3.0g
日本薬局方 フクリョウ…………… 3.0g	日本薬局方 カッセキ…………… 3.0g
日本薬局方 タクシャ…………… 3.0g	

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手のとどかない所に保管すること。
- 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
- 煎じ薬は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用すること。



【問い合わせ先】

本製品についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

東洋漢方製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0120-00-1040

受付時間 9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先
（独）医薬品医療機器総合機構
電話 0120-149-931

製造販売元

東洋漢方製薬株式会社
〒584-0022 大阪府富田林市中野町東2丁目1番16号