

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。  
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管して下さい。

# 東洋漢方の十味敗毒湯エキス顆粒(分包)

(じゅうみはいどくとう)

第2類医薬品

本剤は、華岡青洲先生の創方による十味敗毒湯に準拠して製造されたエキス顆粒剤です。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は服用しないこと

生後3ヵ月未満の乳児。



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 1ヵ月位(化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期)に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

3. 本剤の服用により、まれに症状が進行することもあるので、このような場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## [効能・効果]

化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期、じんましん、急性湿疹、水虫

## [用法・用量]

下記の量を食前に服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数	年齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	1包	3回	7才未満 4才以上	1/2包	3回
15才未満 7才以上	2/3包		4才未満 2才以上	1/3包	
			2才未満	1/4包以下	

### <用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 用法・用量を厳守すること。

### [成分・分量] [本品1日量3包(1包2.0g)中]

日本薬局方 サ イ コ	0.996 g	別紙規格 サ イ コ 末	0.48 g
日本薬局方 オ ウ ヒ	0.996 g	別紙規格 オ ウ ヒ 末	0.48 g
日本薬局方 キ キ ヨ ウ	0.996 g	日本薬局方 キ キ ヨ ウ 末	0.48 g
日本薬局方 センキュウ	0.996 g	日本薬局方 センキュウ末	0.48 g
日本薬局方 ブクリョウ	1.328 g	日本薬局方 ブクリョウ末	0.64 g
日本薬局方 ドクカツ	0.996 g	別紙規格 ドクカツ末	0.48 g
日本薬局方 ハマボウフウ	0.996 g	別紙規格 ハマボウフウ末	0.48 g
日本薬局方 カンソウ	0.332 g	日本薬局方 カンソウ末	0.16 g
日本薬局方 カンキョウ	0.332 g	別紙規格 カンキョウ末	0.16 g
日本薬局方 ケイガイ	0.332 g	局外生規 ケイガイ末	0.16 g
より製した水製乾燥エキス	2.00 g		

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り曲げて保管し、2日以内に使用すること。
- (5) 本剤は生薬を原料としたエキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがあります。効果には変わりありません。



### [問い合わせ先]

本製品についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願ひ申上げます。

東洋漢方製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0120-00-1040

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独) 医薬品医療機器総合機構  
電話 0120-149-931

製造販売元

**東洋漢方製薬株式会社**

〒584-0022 大阪府富田市中野町東2丁目1番16号