

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに**保管**して下さい。

東洋の十全大補湯エキス顆粒(分包)

(じゅうぜんたいほうとう)

第2類医薬品

本剤は中国の宋時代の古典「太平惠民和劑局方」に記載されている十全大補湯に準拠して製造されたエキス顆粒剤です。

⚠️ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸の弱い人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
肝 機 能 障 害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

病後の体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血

【用法・用量】

下記の量を食間又は空腹時に水又は温湯にて服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数	年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	1包	3回	4才未満 2才以上	1/3包	3回
15才未満 7才以上	2/3包		2才未満	服用しないこと	
7才未満 4才以上	1/2包				

【用法・用量に関連する注意】

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- 用法・用量を厳守すること。

【成分・分量】 [本品1日量3包(1包3.0g)中]

日本薬局方 ニンジン	1.5 g	日本薬局方 シャクヤク	1.5 g
日本薬局方 オウゴン	1.5 g	日本薬局方 シオウウ	1.5 g
日本薬局方 ヒャクシュツ	1.5 g	日本薬局方 センキュウ	1.5 g
日本薬局方 フクリョウ	1.5 g	日本薬局方 ケイヒ	1.5 g
日本薬局方 トウキ	1.5 g	日本薬局方 カンゾウ	0.5 g
		より製した水製乾燥エキス	3.12 g

添加物として乳糖、パレイシヨデンプンを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- 1包を分割したり残りを服用する場合には、袋の口を折り曲げて保管し、2日以内に服用すること。
- 本剤は生薬を原料としたエキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがありますが、効果に変わりはありません。



【問い合わせ先】

本製品についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

東洋漢方製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0120-00-1040

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元

東洋漢方製薬株式会社

〒584-0022 大阪府富田林市中野町東2丁目1番16号