

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。  
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管して下さい。

# 東洋の香蘇散料エキス顆粒

(こうそさんりょう)

第2類医薬品

本剤は、中国の宋時代（約1000年前）の古典「太平惠民和劑局方」に記載されている香蘇散に準拠して製造されたエキス顆粒剤です。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 3ヵ月位（かぜの初期に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 【効能・効果】

胃腸虚弱で神経質の人の風邪の初期

### 【用法・用量】

下記の量を食前又は食間に水又は湯温にて服用して下さい。(500g商品の場合：添付のサジはすり切り約1.0gです。)

年 齢	1回量	1日服用回数	年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	1包または1.50g	3回	7才未満 4才以上	1/2包または0.75g	3回
15才未満 7才以上	2/3包または1.00g		4才未満 2才以上	1/3包または0.50g	
			2才未満	服用しないこと	

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- 用法・用量を厳守すること。

### 【成分・分量】 [本品1日量4.5g又は3包(1包1.5g)中]

日本薬局方 コウブシ……………1.05g	日本薬局方 コウブシ末……………1.4g
日本薬局方 ソヨウ……………0.45g	別紙規格 ソヨウ末……………0.6g
日本薬局方 チンピ……………0.90g	局外生規 チンピ末……………1.2g
日本薬局方 カンゾウ……………0.30g	日本薬局方 カンゾウ末……………0.4g
日本薬局方 ショウキョウ……………0.30g	日本薬局方 ショウキョウ末……………0.4g
より製した水製乾燥エキス……………0.5g	

## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。
- 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り曲げて保管し、2日以内に使用すること。
- 本剤は生薬を原料としたエキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なる場合がありますが、効果には変わりありません。



### 【問い合わせ先】

本製品についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

東洋漢方製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0120-00-1040

受付時間 9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先  
（独）医薬品医療機器総合機構  
電話 0120-149-931

製造販売元

**東洋漢方製薬株式会社**

〒584-0022 大阪府富田市中野町東2丁目1番16号